


Jongler avec les fenêtres météo

- Gérer le pâturage comme un déprimage
- Saisir les fenêtres météo pour terminer les récoltes des premières coupes
- Ajuster la complémentation à la qualité de l'herbe pâturée

	Croissance moyenne (kg MS/ha/jour) du 23/04 au 06/05/24	Hauteur moyenne (cm)	
Zone Nord	45	9.9	
Zone Intermédiaire	53	11.7	
Zone Sud	Nord Loire	30	9.6
	Sud Loire	40	10.0
MOYENNE REGION	39	9.9	

La météo sur la semaine passée est restée capricieuse et pluvieuse globalement. Les températures sont restées fraîches, surtout la nuit (en dessous de 10 degrés). Ainsi, la pousse est restée faible en moyenne (proche de 40 kgMS/ha/j) en particulier dans les zones humides et froides et sans fertilisation minérale.



Gérer le pâturage comme un déprimage

Les conditions de pâturage en ce début du mois de mai 2024 sont proches de celles des périodes habituelles de déprimage de février/mars avec cependant, comme difficulté supplémentaire, beaucoup de stocks disponibles dans certaines parcelles. Avec généralement plus de 70 mm de précipitations fin avril-début mai, la portance des parcelles de pâture est toujours très délicate. Pour éviter de trop abimer, il est important de continuer à pâturer au fil en offrant aux vaches laitières seulement la surface nécessaire pour la journée, voire pour la demi-journée et en avançant le fil matin et soir. Cela évite de souiller toute l'herbe d'une grande parcelle par des déplacements importants des animaux en conditions pluvieuses et humides.

Disposer de 2 entrées par parcelle peut également limiter les piétinements à ces endroits très passagers.

Ceux qui ont pu faucher les parcelles trop hautes pour être pâturées les semaines passées peuvent dorénavant agrandir leur circuit de pâturage en privilégiant la portance des parcelles plutôt que le stock disponible dans la parcelle. Le plus gros danger est d'abimer les parcelles peu portantes en cette période de l'année avant un éventuel assèchement rapide de surface (vent du nord est à venir ?) qui pourrait fortement pénaliser les prochaines repousses.

Saisir les fenêtres météo

Un bon épisode climatique, sans pluie et avec des températures enfin « de saison » (plus de 10 °C la nuit et plus de 20° le jour) est prévu du 8 au 12 mai avant un retour probable de pluies du 13 au 20 mai ? Cette belle fenêtre météo est à saisir en priorité pour terminer les premières coupes et pour ensiler les méteils fourragers si ce n'est déjà fait, voire pour faire une deuxième coupe sur les RGI pour les opportunistes en sols sains qui ont pu faire une première coupe fin mars-début avril.

Les sols étant encore « frais » et les trèfles souvent peu présents, surtout dans les parcelles qui ont souffert d'une forte hydromorphie hivernale, un dernier apport d'azote minéral (30 à 40 N/ha) peut être réalisé après cette récolte d'herbe printanière.


Aller voir ses prairies pour ajuster la complémentation

Contrairement aux idées reçues, les prairies de printemps ne sont pas toujours excédentaires en azote. Cette année, avec des légumineuses peu présentes et des sols frais, gorgés d'eau, la minéralisation est peu stimulée. Ainsi, en l'absence de fertilisation minérale, l'herbe peut être faiblement pourvue en protéines. On observe d'ailleurs des taux d'urée du lait parfois très faible (90 à 140 mg/l) dans certains élevages laitiers sans complémentation en maïs à l'auge. Ces résultats confirment un manque de protéines dans cette herbe de printemps (moins de 14% de MAT ?).

Pour les éleveurs qui souhaitent maintenir des bons niveaux de production laitière, il n'est pas aberrant d'apporter un correcteur azoté (1 Kg/VL/j) en complément de l'herbe pâturée, notamment pour lancer la production pendant les 2-3 premiers mois de lactation. Pour confirmer ses décisions, il est tout à fait possible de faire une analyse d'un échantillon d'herbe pâturée (comme pour une récolte d'ensilage) via les laboratoires départementaux ou Agranis.

Penser aux dérobées d'été

Il est trop tard pour envisager un sur-semis de printemps dans les prairies dégradées. Si les parcelles ne sont pas destinées à du maïs, d'autres cultures fourragères d'été comme du sorgho multi-coupe, du colza fourrager ou des mélanges « graminées estivales – trèfles annuels » peuvent être envisagés avec un semis fin mai-début juin pour une exploitation en pâturage ou affouragement en vert 2 à 3 mois après semis.



Bulletin pousse de l'herbe Pays de la Loire, une action partenariale :

Chambre d'agriculture Pays de la Loire 02 53 46 62 28 www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr
SEENOVIA 02 43 64 12 64 www.seenovia.fr